





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

FARG'ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI

**“EPIDEMIOLOGIYA VA
YUQUMLI KASALLIKLAR” KAFEDRASI**

«TASDIQLAYMAN»
O'quv ishlari bo'yicha prorektor, PhD
M. Ashurova
2022 yil “08” 02



EPIDEMIOLOGIK VAZIYATLAR VA IMMUNOPROFILAKTIKA

YAKUNIY NAZORAT UCHUN TESTLAR TO'PLAMI

“Oliy ma'lumotli hamshira” mutaxassisligi uchun

Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti

Kurs - 3 semestr - 6 O'qish shakli kunduzgi

Auditoriya soati jami 54 soatni

Yakuniy nazorat - test

FARG'ONA – 2021



KIRISH

Test savollar to'plami O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti va bakalavriat ta'lim yo'nalishi malaka talablariga asoslangan holda tuzilgan. Ushbu dastur asosida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'qitish jarayonida qo'llagan holda, talabani nazariy ma'lumotidan boshlang'ich amaliy ko'nikmalarni bajarishga o'rgatib, o'rnatilgan ko'nikmalarni zamonaviy tibbiy texnologiyalar orqali amaliyot bilan uyg'unlashtirilgan holda qo'llashga imkon yaratishini inobatga olib yakuniy nazorat uchun test savollar to'plami tuzilgan.

#Astma va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan og'rikan bemorlarni qanday infeksiyalarga qarshi emlash tavsiya etiladi? (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- gripp rotavirus infeksiyasi
- qizamiq, brutsellyoz
- pnevmonokokk
- gripp
- pnevmonokokk, suvchechak

#Faol immunitet hosil qiluvchi immunobiologik preparatni tanlang. (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- immunomodulyator
- zardob
- bakteriofag
- vaksina
- immunoglobulin

#Grippga qarshi vaksinalar qaysi maqsadga qaratilgan antiternalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- virusning M2-ion kanallariga
- virusning oqsil qoplamiga
- virus gemagglutininiga
- virusning ichki antigenlariga
- virusni neyraminidazasiga

#Qizamiqning og'ir asoratlari kiradi. (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- endokardit, miokardit
- ensefalit, meningoensefalit
- orxit, parotit
- kolit, enterit

#12 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun jonli zaiflashtirilgan varisella vaksinasini (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- vaksinaning -1 dozasi (0,5 ml) bir marta
- vaksinaning 1 dozasi (0,5 ml) ta'sir qilgandan keyin birinchi 96 soat ichida bir marta
- kamida 4 hafta oralig'ida ikki doza
- kamida 4 hafta oralig'ida uchta doza, 15 oydan keyin kuchaytirgich
- 1 doza (0,5 ml) ikki marta, 6-10 haftalik interval bilan

#Aholining immunoprofilaktikasini yaxshilash bo'yicha zamonaviy vazifalar qaysi (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- laboratoriya va diagnostika bazasini mustahkamlash
- milliy emlash kalendarini kengaytirish
- sanitariya-ma'rifiy ishlarning kamayishi
- penta va geksavalentli dori vositalarini ishlab chiqishni moliyalashtirish
- vaksina ishlab chiqarishni rivojlantirish va texnik qayta jihozlash strategiyasini ishlab chiqish

#Meningokok infeksiyasiga qarshi emlash quyidagi shaxslarga taklif qilinishi kerak. (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- aspleniya
- immunosuppressiv holat
- komplement tizimining terminal komponentlarining etishmasligi
- rivojlangan OIV infeksiyasi
- sun'iy faol immunitet

#Milliy emlash taqvimiga muvofiq, pnevmokokka qarshi emlash (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- 2 oy
- 6 yosh
- 3 oy
- 3 oy, 6 oy, 12 oy
- 1 yosh

#Immunitetning quyidagi turlari mavjud (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- sun'iy -faol, passiv
- orttirilgan-tabiiy
- tug'ma (turlar)
- latent
- vaqtinchalik

#Rejali emlash amalga oshiriladi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'choqda muloqatda bo'lganlarga
- emlash taqvimiga muvofiq
- mintaqadagi epidemiologik vaziyatga qarab
- epidemiologik xarakterdagi favqulodda holat e'lon qilinganda

#2 yoshdan boshlab bolani yoki kattalarni pnevmokok infeksiyasiga emlash uchun immunobiologik preparat (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- split vaksina
- konyugat vaksina
- subbirlikdagi (subedinichnaya) vaksina
- polisaxaridli vaksina
- o'ziga xos immunoglobulin

#Suvchekchakning eng keng tarqalgan asoratlari qaysi kiradi (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- terining ikkilamchi infeksiyasi
- ichki organlarning shikastlanishi
- pnevmoniya
- mielit
- ensefalit

#5 yoshgacha bo'lgan bolalarda qanday vaksinalar qo'llanilmaydi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

Internet saytlari:

1. www.minzdrav.uz;
2. www.tma.uz
3. [www. Ziyonet](http://www.Ziyonet);
4. www.epid.uz;
5. www.epidem.uz;
6. <https://www.iaea.org/> (International Atomic energ. Agen.)
7. [www. fjsti.uz](http://www.fjsti.uz)

- 3 oydan
- 18 oydan

#Varisellaga qarshi emlanishi kerak (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- harbiy xizmatga chaqiriluvchilar
- ilgari emlanmagan va suvchechak bilan kasallanmaganlar
- og'rib o'tganlar
- xavf ostidagi kattalar
- xavf ostidagi bolalar

#Meningokokk kasalligi uchun xavf omillari (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- hayotning birinchi yillaridagi bolalar
- bemor bilan yaqin aloqada bo'lish
- semirish
- aspleniya

#Qizamiqda quyidagi asoratlar guruhлари mavjud (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- mushak-skelet tizimi
- nafas olish tizimi
- MNT (TSNS)
- qon tomir tizimi
- OIT (JKT)

#Suvchechakga qarshi emlashdan keyin qancha vaqt davrida homiladorlikdan saqlanish tavsiya etiladi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 3 oy
- Hojati yo'q
- 1 hafta
- 1 oy
- 6 oy

#Gripp og'i kechuvchi xavf guruhlar (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 65 yoshdan oshgan qariyalar
- 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar
- 16 yoshdan oshgan o'smirlar
- 20 yoshdan oshgan, surunkali patologiya tarixi bo'lmagan shaxslar

#2 yoshgacha bo'lgan bolani pnevmokokk infeksiyasi qarshi emlash uchun immunobiologik preparat (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- split vaktsina
- polisaxarid vaktsinasi
- konyugat vaktsina
- o'ziga xos immunoglobulin
- subbirlkdagi vaktsina

#Quyidagi guruhlar parotitga qarshi emlanishi kerak (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- kasallanmaganlar
- subfebril haroratli kasallik o'choqlarida bo'lgan shaxslar
- kasallik o'chog'ida aloqada bo'lgan shaxslar
- tuzalganlar
- emlanmagan va profilaktik emlashlar haqida ma'lumot bo'lmagan shaxslar

#Qizamiqqa chalingan bemor bilan aloqada bo'lgan kattalarga qanday dozada immunoglobulin yuborish kerak (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1,5 ml
- 2 ml,
- 2,5 ml
- 3 ml
- 6 ml

#Emlashlarni amalga oshirishda ishtirok etishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlari (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- 5 yildan beri xoletsistit bilan og'rigan hamshira
- 2 kun oldin otopsiyani panaritium qilgan hamshira
- 3 yildan beri oshqozon yarasi kasalligi bilan og'rigan shifokor
- 1 yildan beri ekzema bilan og'rigan shifokor
- surunkali tonzillitning kuchayishi bilan shifokor

#Muntazam emlashlarda kim ishtirok etadi? (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- terapevt
- pediatr
- laborant
- epidemiolog
- bakteriolog

#Vaktsinani kiritish uchun ko'rsatmalar (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- muayyan yosh guruhlari uchun muntazam emlashlar
- shaharda kasalliklarning tarqalish xavfi
- yuqumli bemorlar bilan muloqot qilish
- yuqumli kasallikning o'tkir shakli bo'lgan bemorni davolash
- infeksiya xavfi yuqori bo'lgan hududlarga xizmat safarlari

#Tirik vaktsinalarning vaktsina shtammlariga qo'yiladigan talablar (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqori virulentlik va patogenlik
- virulentlik va patogenlikning yo'qligi
- yuqori immunogenlik
- antijenlarning to'liq to'plami
- emlanganlarning tanasida ko'payish qobiliyati

#Faollashtirilgan vaktsinalarning vaktsina shtammlariga qo'yiladigan talablar (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqori virulentlik va patogenlik
- virulentlik va patogenlikning yo'qligi
- yuqori immunogenlik
- antijenlarning to'liq to'plami
- emlanganning tanasida ko'payish qobiliyati

VI. Asosiy va qo'shimcha o'quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi emlash milliy dasturi.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining "Vaktsinalar yordamida boshqariluvchi yuqumli kasalliklar va immunizatsiya" dasturi bo'yicha tibbiyot xodimlari va pedagoglar uchun qo'llanmasi. – Toshkent." RIO TMA" 2018 y.
3. 2018 yildagi EKNT (PPPI) ustidan epidemiologik nazoratni o'tkazish bo'yicha 012-3/328-sonli qo'llanma.
4. 2015 yildagi "O'zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasi" SanOvaMlari №0239-07.
5. 2015 yil 27 yanvardagi "Boshqariluvchi yuqumli kasalliklarni immunoprofilaktikasini tashkil qilish va o'tkazish to'g'risida"gi 36-sonli buyruq.
6. Mirtazaev O.M. va boshqa hammualiflar. Epidemiologiyadan amaliy mashg'ulotlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent. "Adabiyot uchqunlari". 2015 y.
7. Pokrovskiy V.I. Infektsionnye bolezni i epidemiologiya «GEOTAR – Media» - 2008
8. XIB-infektsiyasi 2008 yildagi 53-soli buyruq.
9. Rotovirus infektsiyalari 2007 yildagi 420-soli buyruq.
10. Vaktsinalarni saqlash omborlarida 2006 yildagi 148-sonli buyruq.
11. Xalqaro tibbiy-sanitar qoidalar 2005 yil.
12. I.R.Ashirova, D.A.Asqarova. Bolalarni emlash asoslari. Toshkent – 2003
13. Yushuk N.D., Мартынов Ю.В. Epidemiologiya Moskva, «Meditsina» – 2003
14. Polioieelit va OPV ustidan epidemiologik nazoart 672-sonli buyruq.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Vaktsiny i immunoprofilaktika v sovremennom mire. Rukovodstvo dlya vrachev. L.S. Namazovoy-Baranovoy, N.I. Briko, I.V. Fel'dblyum. **God izdaniya:** 2021
2. Knigu o vaktsinatsii dlya vsekh. Elektronnaya pochta: publikationen@bundesregierung.de Telefon: 030 182722721, Faks: 030 18102722721 Pochta: Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132 Rostock Nomer zakaza: BMG-G-11160rus 1-e izdanie, iyuny 2021 g.
3. Immunologicheskie osnovy immunizatsii, sbornik VOZ modul' 7: Корь Obnovlenie, 2020 g.
4. Allergologiya i immunologiya. Prakticheskie rekomendatsii dlya pediatrov A.A. Baranova, L.S.Namazovoy-Baranovoy, R.M.Xaitova. 2020 **ISBN:** 978-5-6042577-2-2
5. Cherenova L.V., Kashtigo T.V., Sayadyan X.S., SHmarov M.M. Razrabotka vaktsin na osnove adenovirusnykh vektorov: Obzor zarubezhnykh klinicheskikh issledovaniy (chasty 1). Meditsinskaya immunologiya. 2017;19(2):111-126. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-2017-2-111-126>
6. O'zbekiston Respublikasi "Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent: 26.08. 2015y.
7. Teoriya i praktika vaktsinologii: monografiya / N.V. Medunitsyn, A.N. Mironov, A.A. Movsesyants. – Moskva: Izdatel'stvo OOO «REMEDIUM», 2015. – 496 s. **ISBN** 978-5-905304-04-0
8. Vaktsiny i vaktsinatsiya. - Zverev V.V. - Natsional'noe rukovodstvo. GEOTAR-Media, 2014 g.
9. Immunoprofilaktika - Tatochenko V.K. – Spravochnik 22/07/2012 20:22. 2009
10. Aleksandr Migunov: Privivki. Sovremennyy spravochnik po vaktsinatsii Podrobnее: <https://www.labirint.ru/books/79444/> 2005
11. Vaktsiny, vaktsinatsiya i immunnyy otvet | Ada Gordon, Ramsey Alister Meditsina 2002
12. Epidemiologiya i Vaktsinoprofilaktika ISSN 2073-3046 (Print) ISSN 2619-0494 (Online)
13. Immunologiya - Xaitov P.M. – Uchebnik 2000

- subbirlik
- butun virion
- split vaksinalar
- tirik

#Kattalar uchun Prevenar-13 emlash sxemasi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- kamida 8 hafta oralig'ida uchta doza
- bir marta
- kamida 3 hafta oralig'ida ikki doza
- kamida 4 hafta oralig'ida ikki doza
- kamida 2 hafta oralig'ida uchta doza, 15 oydan keyin revaksinatsiya

#Og'ir gripp xavfi ostida bo'lganlar kiradi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tug'ish yoshidagi ayollar
- 30 yoshdan oshgan, surunkali patologiya tarixi bo'lmagan shaxslar
- 15 yoshdan oshgan o'smirlar
- homilador

#Varisellada yuqori o'lim kuzatiluvch yosh guruhi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'smirlar
- 8 yoshgacha bo'lgan bolalar
- 10 yoshgacha bo'lgan bolalar
- kattalar
- 5 yoshgacha bo'lgan bolalar

#13 yoshdan oshgan odamlar uchun jonli zaiflashtirilgan suvchechak vaktsinasi

- kamida 4 hafta oralig'ida uchta doza, 15 oydan keyin revaksinatsiya
- kamida 4 hafta oralig'ida ikki doza
- bir marta vaktsinaning 1 dozasi (0,5 ml)
- 1 doza (0,5 ml) 6-10 haftalik interval bilan ikki marta

#13 yoshgacha bo'lgan bolalarda jonli zaiflashtirilgan suvchechak vaktsinasi bilan emlash sxemasi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- Kumbs reaksiyasidan so'ng o'tkazish kerak
- 10-14 haftalik interval bilan ikki marta
- 6-10 haftalik interval bilan ikki marta
- kamida 4 haftalik interval bilan uch marta
- bir marta

#13 yoshdan kattalarga attenyirlangan varisella vaktsinasi bilan emlash sxemasi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 6-10 haftalik interval bilan ikki marta
- kamida 4 haftalik interval bilan uch marta
- Kumbs reaksiyasi
- 10-14 haftalik interval bilan ikki marta
- bir marta

#Rejali profilaktik emlashlarning milliy kalendariga ko'ra, qizamiqqa qarshi emlash qaysi yoshdan boshlanadi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1 yoshdan
- 2 oydan

-rekombinant vaktsinani yuborish

#Taklif etilgan ro'yxatdan faol immunitet yaratish uchun ishlatiladigan biologik preparatlarni tanlang: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- jonli vaktsina
- faolsizlangan vaktsina
- gomologik zardob
- interferon
- bakteriofag

#Taklif etilgan ro'yxatdan passiv immunitetni yaratish uchun ishlatiladigan biologik preparatlarni tanlang: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- faolsizlangan vaktsina
- bakteriofag
- gomologik zardob
- anatoksin
- interferon

#Taklif etilgan ro'yxatdan jonli vaktsinalarni tanlang: (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- parotitga qarshi emlash
- tifga qarshi emlash
- BTSJ (BTSJ)
- leptospirozga qarshi emlash
- poliomielitga qarshi emlash (OPV)

#Taklif etilgan ro'yxatdan inaktivlangan vaktsinalarni tanlang: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- quturishga qarshi emlash
- tifga qarshi emlash
- BTSJ (BTSJ)
- kuydirgiga qarshi emlash
- poliomielitga qarshi emlash (IPV)

#Tirik vaktsinalar ishlab chiqarish uchun vaktsina shtammlariga qo'yiladigan talablar: (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqori virulentlik
- yuqori patogenlik
- virulentlik va patogenlikning yo'qligi
- antigenlarning to'liq to'plami
- emlanganning tanasida ko'payish qobiliyati
- yuqori immunogenlik

#Inaktivlangan vaktsinalar ishlab chiqarish uchun vaktsina shtammlariga qo'yiladigan talablar: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqori virulentlik va patogenlik
- virulentlik va patogenlikning yo'qligi
- antigenlarning to'liq to'plami
- emlanganning tanasida ko'payish qobiliyati
- yuqori immunogenlik

#Inaktivlangan vaktsinalarni ishlab chiqarish uchun kimyoviy moddalar qo'llaniladi: (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- fenol

#Favqulodda vaziyatlarning maxsus profilaktikasini o'tkazish taktikasi tomonidan belgilanadi

(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- yaraning, shikastlanishning tabiatiga ko'ra
- jabrlanuvchining emlangan anamnezi
- jarohatlardan keyin o'tgan vaqt
- jabrlanuvchining kasbi

#Profilaktik emlashlar tayinlangan kuni qanday tadbirlar o'tkaziladi? (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazish
- termometriya
- qon kimyosi
- ota-onalarni emlash uchun ruxsatnoma
- nojo'ya ta'sirlarning mumkin bo'lgan ko'rinishlari haqida ma'lumot

#Immunoprofilaktika samaradorligi mezonlari (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- klinik
- immunologik
- epidemiologik
- serologik
- biokimyoviy

#Kasallikni pasaytirish bilan bog'liq holda emlashning epidemiologik samaradorligini baholash uchun qanday ko'rsatkichlar qo'llaniladi? (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- mavsumiylik
- tsiklik
- fokuslar
- bolalar guruhlarining mag'lubiyati
- kasallanishning yosh tarkibining o'zgarishi

#Qoqsholning shoshilinch immunoprofilaktikasi uchun qanday ko'rsatkichlar mavjud? (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- terining qattiqlashishi
- teri ko'rinishlarining yaxlitligini buzish bilan jarohatlar
- kasalxonadan tashqari abortlar
- hayvonlarning chaqishi
- kuyishlar I I I I I, I Y daraja

#Qoqshol shoshilinch profilaktikasi uchun qanday dorilar qo'llaniladi? (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- adsorbsiyalangan tetanoz toksoidi
- inson qoqshol immunoglobulini
- qoqsholga qarshi sarum, tozalangan
- PSHI yo'qligida tozalangan tetanoz toksoidi
- tetanozga qarshi emlash

#Qaysi shaxslar shoshilinch quturishning oldini olish huquqiga ega? (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- noma'lum it tishlaganida
- uy hayvonining terisini tirnash
- xom yovvoyi cho'chqa go'shtini iste'mol qilganda
- terini qayta ishlashda o'lik tulki topildi
- odam boshiga ko'rshapalak tishlaganda

#Bemor bilan bir vaqtda ovqat iste'mol qilgan sog'lom odamlarga anti-botulinum sarumining qanday dozasini berish kerak? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- sarumning bir terapevtik dozasi
- ikki davolash dozasi
- sarumni in'ektsiya qilishning hojati yo'q
- davolash dozasining yarmi
- 1,5 terapevtik doza

#Qizamiq bilan kasallanmagan, lekin kasal odam bilan aloqada bo'lgan bolalarga qizamiq immunoglobulinini qaysi kungacha yuborish mumkin? (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- birinchi kunida
- 3 kungacha
- oltinchi kuni
- sakkizinchi kuni
- o'ninchi kuni

#Agar hayvon kasal bo'lib, o'lgan, yo'qolib qolgan bo'lsa, profilaktik maqsadlarda terisi shikastlangan shilimshiqlarga 1,0 ml dozada quturgan vaktsinasini necha marta yuborish kerak? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1 marta
- 2 marta
- besh marta
- 6 marta
- 8 marta

#Agar hayvon 10 kun davomida sog'lom bo'lsa, profilaktika chorasi sifatida terining shilimshiqi bo'lgan odamlarga quturishga qarshi emlash kerakmi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- bir marta tayinlash
- tayinlamang
- sxema bo'yicha faqat emlashni tayinlang
- quturishga qarshi immunoglobulin -vaktsina bilan birgalikda davolashni buyurish
- quturganlarga qarshi immunoglobulinni darhol yuborish

#Qochib ketgan uy hayvonlari tomonidan chaqishi bo'lgan odamlarga zudlik bilan quturishga qarshi davolanish kerak, tashxisi noma'lum (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- bir marta tayinlash
- tayinlamang
- sxema bo'yicha faqat emlashni tayinlang
- zudlik bilan quturgan immunoglobulin -vaktsina bilan birgalikda davolashni o'tkazing
- quturishga qarshi immunoglobulinni darhol yuborish

#Meningokokk infeksiyasining umumiy shakli bo'lgan bemor bilan aloqada bo'lgan 7 yoshli bolaga immunoglobulinning qanday dozasini berish kerak (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1,5 ml
- 2 ml,
- 2,5 ml
- 3 ml
- 6 ml

#Profilaktik emlashlarning rejalashtirilgan milliy taqvimi o'z ichiga oladi (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'tkir yuqumli patologiyasi bo'lgan bemorlar
- 6 oylik bolalar
- muayyan kasb va lavozimlarda ishlaydigan kattalar (tibbiyot xodimlari va ta'lim tashkilotlari, transport, kommunal xizmatlar)
- kasbiy ta'lim va ta'lim tashkilotlarida talabalar oliy ta'lim tashkilotlari (16 yosh)
- 1-11-sinf o'quvchilari

#Meningokokkga qarshi emlash uchun ko'rsatmalar (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqori endemik mintaqaga sayohat qilganda
- agar endemik mintaqada yashasa
- harbiy xizmatga chaqirilganda
- meningokoksemiya belgilari bo'lsa
- meningokokk infeksiyasi o'choqlarida yashovchi bolalar va kattalar (serogrup A)

#Emlash uchun moneliklar (tana massasi indeksi >25 bo'lsa) (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- surunkali patologik jarayonlarning kuchayishi
- surunkali yuqumli kasalliklar
- og'ir allergik kasalliklar
- jigar, buyraklar, markaziy asab tizimi, yurak kasalliklari
- yuqumli bo'lmagan kasalliklar

#Faol tabiiy immunitet shakllanadi (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- Yuqumli kasallikdan so'ng
- Tashuvchida
- Jonli vaksinani kiritish
- Kimyoviy vaksinani kiritish
- Infektsiya manbasi bilan aloqa qilganda patogenning fraksiyonel dozalarining organizmga kirishi

#Faol sun'iy immunitet ... tomonidan shakllanadi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- Yuqumli kasallikdan so'ng
- Tashuvchida
- Jonli vaksinani kiritish
- Kimyoviy vaksinani kiritish
- Infektsiya manbasi bilan aloqa qilganda patogenning fraksiyonel dozalarining organizmga kirishi

#Passiv tabiiy immunitetni (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- geterolog immunoglobulinni kiritish
- geterologik zardobni kiritish
- gomologik immunoglobulinni kiritish
- interferonni kiritish
- onadan yangi tug'ilgan chaqaloqlarga antitellalarni olish

#Passiv sun'iy immunitetni (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- geterolog immunoglobulinni kiritish
- geterologik zardobni kiritish
- gomologik immunoglobulinni kiritish
- interferonni kiritish

#Hayotning birinchi yillarida bolalar qaysi yuqumli kasalliklardan (patogenlarning yuqish mexanizmligiga qarab) asosan emlanadi? (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- ichak (fekal-og'iz mexanizmi)
- tashqi teri infeksiyalari (kontakt)
- nafas olish yo'llari infeksiyalari (aerozol)
- qon infeksiyalari
- transmissiv infeksiyalar

#Sovuq zanjir (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- Yaxshi immunogen ta'sirni ta'minlash uchun preparatni qo'llashdan oldin sovutish
- ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga vaktsinalarni tashish paytida haroratni nazorat qilish
- Vaktsinalarni saqlash uchun haroratni nazorat qilish tizimi
- ishlab chiqaruvchidan qabul qiluvchiga vaktsinalarni saqlash va tashish paytida haroratni nazorat qilish tizimi
- Vaktsinalarning ishlab chiqaruvchi joyidan emlangangacha yaxlitligini vizual nazorat qilish tizimi

#Muzlatgichda vaktsinalarni tashkil qilish va saqlashning oqilona usulini tanlang:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- "eski" (ilgari olingan) va "yangi" vaktsinalarning alohida joylashishi
- Barcha vaktsinalarni yuqori javonda saqlang
- Vaktsinalarni har qanday javonda va muzlatgich eshigida bir xil darajada samarali saqlash
- Vaktsina qutilari butun bo'shliqni mahkam to'ldirishlari kerak
- Muzlatgichda

#Vaktsina preparatlarini saqlashning harorat rejimini buzishning eng katta xavfi qaysi bosqichlarda? (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- ishlab chiqaruvchining omborida
- dori vositalarini saqlash hududiy omborida
- Vaktsinalarni tashishda
- vaktsinatoming ish joyida
- dori vositalarini saqlash respublika omborida

#BCG vaktsinasi tarkibiga quyidagilar kiradi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- mikobakteriya tuberkulyozining inaktivlashtirilgan madaniyati
- sigir mikobakteriyalari
- sigir turi Mycobacterium tuberculosis vaktsina shtammi
- korinebakteriyalarning vaktsina shtammi
- meningokokk bakteriyalarining vaktsina shtammi

#Emlash paytida BTJS vaktsinasini qanday yuborish kerak:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- teri ichiga
- intradermal
- teri ostiga
- og'iz orqali
- tomir ichiga

#Revaktsinatsiya paytida BCG vaktsinasini qanday yuborish kerak:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- teri ichiga
- intradermal
- teri ostiga
- og'iz orqali

epidemik ko'rsatkichlar bo'yicha immunoprofilaktika qarshi ishlatilishi mumkin: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriya
- ko'k yo'tal
- Suvchechak
- tulyaremiya
- gripp

#Qoqshol shoshilinch profilaktikasi uchun ko'rsatmalar: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- II, III va IV darajali muzlash va kuyishlar
- hayvonlarning chaqishi
- hayvonlarning tupuriklari
- oshqozon-ichak traktining penetratsion shikastlanishi
- yuqori ekstremitalarning yopiq sinishi

#Qoqsholning shoshilinch profilaktikasi uchun taktika baham ko'ring: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- kasb
- yoshi
- tetanozga qarshi emlash ma'lumotlari
- o'tmishdagi somatik kasalliklar haqida ma'lumotlar
- jabrlanuvchida shikastlanishning lokalizatsiyasi

#Sun'iy passiv immunitet quyidagi dorilar kiritilgandan keyin shakllanadi: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- sarumlar
- immunoglobulinlar
- toksoidlar
- zaiflashtirilgan vaktsinalar
- rekombinant vaktsinalar

#Immunoprofilaktika samaradorligini baholash (3ta to'g'ri javobni tanlang)

quyidagi mezonlarga muvofiq:

- ijtimoiy
- immunologik
- epidemiologik
- allergik
- klinik

#Immunizatsiya epidemik ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- bolalar muassasasiga hujjatlar berilgan bolalar
- tegishli yoshga etgan bolalar
- faoliyat xususiyatiga ko'ra infektsiya xavfi ostida bo'lgan odamlar
- yuqumli kasalliklar o'choqlarida
- sariq isitma bilan kasallangan mamlakatlarga sayohat qilganda

rejalashtirilgan emlash quyidagilarga qarshi amalga oshiriladi: (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriya
- tetanoz
- gripp
- gepatit A
- gepatit B

#Qizamiqqa qarshi jonli vaksinalarni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar va parotit:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- tug'ma kombinatsiyalangan immunitet tanqisligi
- soqchilik tarixi
- malign neoplazmalar
- sarumlarni kiritish uchun allergik reaksiyalar
- tuxum oqiga anafilaktik reaksiyalar

#Bo'lmagan shaxslar profilaktik emlashdan asosli ravishda rad etilgan:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriya
- parotit
- poliomelit
- gripp
- ko'k yo'tal

#Shoshilinch ravishda quturishga qarshi emlash kerak:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- ovchilar
- it tutuvchilar
- yovvoyi yirtqich hayvonlar tishlagan odamlar
- ko'cha quturgan virusi bilan ishlaydigan laboratoriyalar xodimlari
- g'oyib bo'lgan noma'lum yirtqich jonzo tomonidan tishlagan odamlar

#Qizamiqning shoshilinch profilaktikasi diqqat markazida:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- bajarilmagan
- faqat qizamiqqa qarshi jonli vaksina bilan amalga oshiriladi
- faqat qizamiqqa qarshi immunoglobulin bilan amalga oshiriladi
- qizamiqqa qarshi jonli vaksina yoki qizamiq immunoglobulini bilan qo'llaniladi

#Qizamiqqa qarshi jonli vaksina bilan shoshilinch emlash amalga oshiriladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- katta yoshli 22 yosh, 2 kun oldin qizamiq bilan kasallangan bemor bilan aloqada bo'lgan, o'zi qizamiq bilan kasallanmagan, emlanmagan
- 3 yoshli bola, 10 kun oldin qizamiq bilan kasallangan, emlanmagan bola bilan aloqa qilgan
- 14 yoshli sog'lom bola qizamiq bilan og'rikan bemor bilan aloqada bo'lgan, 2 oylik qizamiq bilan kasallangan.
- o'tkir bosqichda eksudativ diatez bilan og'rikan 9 oylik bola, 2 kun oldin qizamiq bilan kasallangan bemor bilan aloqada bo'lgan.

#“Profilaktik emlashni tashkil etish va o'tkazish nizomi” to'g'risidagi buyruq tasdiqlansin:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- UZB Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan
- Oliy Majlis
- Prezident farmoni
- viloyat sog'liqni saqlash ijroiya organi

#To'liq emlash kursidan keyin 6 oy o'tgach, hayvonlardan qayta-qayta og'ir tishlaganlar, quturishga qarshi emlanganlar uchun o'tkaziladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlanmaydi
- quyidagi emlashlarni hisobga olmagan holda ko'rsatmalarga muvofiq to'liq kursni o'tkazish
- qisqartirilgan (3 marta -quturishga qarshi immunoglobulinni kiritish bilan emlash kursi)
- qisqartirilgan (3 marta -quturishga qarshi immunoglobulin kiritilmagan emlashlar

- formalin
- mertiolat
- xlor saqllovchi moddalar
- spirt

#Inaktivlangan vaksinalarni ishlab chiqarish uchun fizikaviy usullar qo'llaniladi:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- isitish
- qaynatish
- suv bug'i
- quritish
- UBN (UFO) bilan nurlantirish

#Interferonning ta'sir qilish mexanizmi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- virusga qarshi immunitet hosil qiladi
- bakteriyalar va viruslarni parchalaydi
- Hujayralarga viruslarni kirishidan himoya qiladi
- antibakterial immunitet hosil qiladi
- gumoral immunitet hosil qiladi

#Anatoksin-bu... (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- neytrallangan endotoksin
- neytrallangan ekzotoksin
- inaktivatsiyalangan mikroblar massasi
- zaharlanmagan endotoksin
- neytrallanmagan ekzotoksin

#Vaksina olish uchun ko'rsatmalarni tanlang (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- muayyan yosh guruhlarida rejali emlashlar
- tumanda yoki shaharda kasalliklarning tarqalish xavfi
- vaksinadan keyingi asoratlari
- yuqumli bemorlar bilan muloqot qilish
- kasallikning o'tkir shakli bilan og'rikan bemorni davolash
- kasallik tez-tez uchraydigan hududga sayohat qilishdan oldin

#Zardoblar va immunoglobulinlarni kiritish uchun ko'rsatmalarni tanlang:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- muayyan yosh guruhlarida rejali emlashlar
- tumanda yoki shaharda kasalliklarning tarqalish xavfi
- vaksinadan keyingi asoratlari
- yuqumli bemorlar bilan muloqot qilish
- kasallikning o'tkir shakli bo'lgan bemorni davolash
- kasallik tez-tez uchraydigan hududga sayohat qilishdan oldin

#Rejali emlash paytida emlashni tashkil etish va o'tkazishda quyidagi shaxslar ishtirok etadilar:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- pediatr
- laborant
- epidemiolog
- bakteriolog
- immunolog

#AKDS-emlashning emlashdan keyingi asoratlari quyidagilardan iborat:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- pirsingli qichqiriq epizodlari
- tana haroratining ko'tarilishi tufayli konvulsiyalar
- in'ektsiya joyida giperemiya va infiltrat
- angioedema
- tana haroratining 38 S gacha ko'tarilishi

#Qizamiqqa qarshi emlash tarkibiga quyidagilar kiradi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- inaktivatsiyalangan qizamiq virusi
- tirik qizilcha virusi
- qizamiq virusining tirik vaksina shtammi
- qizamiq virusining inaktivlashtirilgan vaksina shtammi
- qizilcha virusining inaktivlashtirilgan emlash shtammi

#Qizilchaga qarshi emlash tarkibiga quyidagilar kiradi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- qizamiq virusining inaktivlashtirilgan vaksina shtammi
- inaktivatsiyalangan qizilcha virusi
- tirik zaiflashgan qizilcha virusi (vaksina shtammi)
- qizilcha virusining inaktivlashtirilgan shtammi
- tirik qizamiq virusi

#Parotitga qarshi emlash tarkibiga quyidagilar kiradi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik parotit virusi
- inaktivatsiyalangan parotit virusi
- parotit virusining tirik vaksina shtammi
- parotit virusining inaktivlashtirilgan vaksina shtammi
- parotit virusining ustki antigenlari

#Qizilchaga qarshi rejali emlash:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 6 oygacha bo'lgan bolalar
- 6 oydan 12 oygacha bo'lgan bolalar
- 12-15 oylik bolalar, 18 oylikda revaksinatsiya
- 13 yoshli qizlar, kasal emas va qizilchaga qarshi emlanmagan
- 13 yoshli o'g'il bolalar, kasal emas va qizilchaga qarshi emlanmagan

#Grippga qarshi emlash turlari:(4ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik
- inaktivatsiyalangan butun virion
- Split vaksina
- polimer birikmali
- anatoksinlar

#Grippga qarshi emlash uchun qarshi ko'rsatmalar:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'tkir yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklar
- o'tkir bosqichdagi surunkali kasalliklar
- tuxum oqsiliga allergiya
- disbakterioz
- qizil yuguruk

#Interferonning kiritish ko'rsatmalari:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

-AKDS

-tirik qizamiqga qarshi emlash

-gepatit B vaktsinasi

-jonli parotitga qarshi emlash

#Qoqsholga qarshi antitanalar himoya titri (RPGda hisoblangan yut:(4ta to'g'ri javobni tanlang)

-1:10

-1:20

-1:40

-1:80

-1:160

#AKDS vaktsinasi bilan muntazam emlash quyidagi yoshda amalga oshiriladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

-3 oy

-6 oy

-7 oy

-12 oy

-18 oy

#Qizamiqga qarshi muntazam emlash va qayta emlash sxemasi (1ta to'g'ri javobni tanlang)
vaktsinani qo'llashdan oldin:

-12 oy

-15 yil

-6 yil

-11 yil

-18 yil

#Mantu sinamasining maqsadi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

-yuqumli allergiyani aniqlash

-emlashdan keyingi gumoral immunitetni aniqlash

-silga qarshi qayta emlash uchun shaxslarni tanlash

-silga qarshi birlamchi emlash uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tanlash

-silning aniq tashxisi

#qarshi profilaktik emlashni asossiz rad etgan shaxslar ishga qo'yilmaydi :(2ta to'g'ri javobni tanlang)

-qizilcha

-sil kasalligi

-gepatit B

-qizamiq

-qoqshol

#qoqsholda shoshilinch profilaktikasi uchun dorilar:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

-AD-anatoksin

-AS-toksoid

-ADS-M-anatoksin

-DTP vaktsinasi

-PSCHI

#Emlashning epidemiologik samaradorligi baholanadi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

-kasalliklar bilan yuqadigan infeksiyalarning oldini olish bilan bog'liq xarajatlarni tejash uchun

- epidemik jarayonga ta'siri bilan
- agar asorotlar mavjud bo'lsa
- kasallanishni kamaytirish uchun
- antitellarning "himoya" darajasiga ega bo'lgan shaxslar foiziga ko'ra

#Rejali profilaktik emlashlar amalga oshiriladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- tibbiyot muassasalaridagi emlash xonalarida
- maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarning tibbiy kabinetlarida
- bolaning yashash joyi
- emlash guruhlariga tashrif buyurish
- bolalar uchun yozgi lagerlarda

#rejalashtirilgan emlash quyidagilarga qarshi amalga oshiriladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- Suvchechak
- parotit
- gripp
- ko'k yo'tal
- qorin tifi

#Teri ostiga yuboriladigan vaksinalar:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- BCG
- AKDS
- qizamiqqa qarshi emlash
- Gepatit B ga qarshi emlash
- parotitga qarshi emlash

#Qizlarda parotitga qarshi emlash va qayta emlash sxemasi o'z ichiga oladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- 12 oylik emlashlar
- 6 yoshda emlashlar
- 15 yoshda emlashlar
- 11 yoshda emlashlar
- 18 yoshda emlashlar

#Bolalarda qizilcha kasalligiga qarshi emlash va qayta emlash sxemasi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

o'z ichiga oladi:

- 12 oylik emlashlar
- 6 yoshda emlashlar
- 15 yoshda emlashlar
- 11 yoshda emlashlar
- 18 yoshda emlashlar

#Emlashdan keyingi normal o'ziga xos reaksiya (2ta to'g'ri javobni tanlang)

BCG ni joriy etish:

- papula hajmi 5-10 mm
- diametri 10 mm gacha bo'lgan chandiq
- kolloid chandiq
- diametri 20 mm bo'lgan infiltrat
- terining 3 sm dan ortiq giperemiyasi

-tomir ichiga

#Ro'yxatga olingan bolalardan qaysi biri tug'ruqxonada silga qarshi emlanishi mumkinligini ko'rsating?(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- hayotning 5-kunida sog'lom bola (3800 gr).
- hayotning 7-kunida erta tug'ilgan chaqaloq (2400 g).
- hayotning 8-kunida erta tug'ilgan chaqaloq (1900 g).
- bola (3200 gr), hayotning 5-kuni, tana harorati 37,8 S
- bola (3200 gr), omfalit bilan hayotning 5-kuni

#Gepatit B ga qarshi emlash:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- "jonli"
- faolsizlangan
- kimyoviy
- rekombinant
- anatoksin

#Poliomielitga qarshi emlash bolaga berilishi kerak:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- ovqatdan 3 soat oldin
- ovqatdan 1 soat oldin
- ovqatlanayotganda
- keyin ovqatdan keyin
- ertalab bo'sh qoringa

#Poliomielitga qarshi jonli vaksina tarkibiga quyidagilar kiradi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- yovvoyi poliovirus 1, 2, 3 turlari
- 1 va 3 turdagi poliovirusning zaiflashtirilgan shtammlari
- 1, 2 va 3 turdagi poliovirusning zaiflashtirilgan shtammlari
- 1, 2 va 3 turdagi poliomielit virusining faollashtirilgan shtammlari
- poliomielit virusining 1, 2 va 3 turdagi zaiflashgan shtammlarining sirt antijenlari

#AKDS-vaksinani kiritishga qarshi ko'rsatmalar quyidagilar:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- anamnezida sudirgi sindromi
- malign qon kasalliklari
- 4 hafta oldin gripp bilan kasallanganman
- birinchi emlashdan keyin tana haroratining 37,8 S gacha ko'tarilishi
- Oldingi emlashdan keyin Qvinke toshmasi

#Difteriyaga qarshi zardob ishlatiladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriya epidemiyasi o'chog'ida bemor bilan aloqada bo'lgan shaxslardan
- profilaktik emlashlar milliy taqvim doirasida rejalashtirilgan
- epidemiologik ko'rsatkichlarga ko'ra
- difteriya bilan og'rigan bemorlarni qon zardobidan
- inson tanasining oqsiliga sezgirlik holatini aniqlash uchun intradermal allergik testni o'rnatish uchun

#AC-toksinida buyuriladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- profilaktik emlashlar milliy taqvim doirasida rejalashtirilgan
- epidemiologik ko'rsatkichlarga ko'ra
- difteriya epidemiyasi o'chog'ida bemor bilan aloqada bo'lgan shaxslar
- ko'k yo'talning epidemiyasi bo'lgan bemor bilan aloqada bo'lgan shaxslar
- qoqshol epidemiyasi o'chog'ida bemor bilan aloqada bo'lgan shaxslar

#Yuqumli kasalliklarga qarshi shoshilinch emlash uchun sanab o'tilgan epidemiologik ko'rsatkichlardan qaysi biri eng mos keladi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- epidemik vaziyat
- kasallanish dinamikasidagi mavsumdan tashqari davr
- jamoatchilikning ko'p qismi
- kemiruvchilar sonining ko'payishi
- kasallikdan o'limning mavjudligi

#Quyidagi epidemiologik ko'rsatkichlardan qaysi biri shoshilinch vaksinani qo'llash uchun eng mos keladi? (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasallikning tarqalishining epidemiyadan keyingi davrida
- yuqumli kasallikning tarqalishining epidemiyadan oldingi davrida
- yuqumli kasallikning epidemiyasi avjida
- yuqumli kasallikning tarqalish xavfi ma'lum hudud mavjud bo'lganda
- yuqumli kasallikning tarqalishining epidemik davrida

#Sanab o'tilgan epidemiologik ko'rsatkichlardan qaysi biri qon zardobi va immunoglobulinlarni yuborish uchun eng mos keladi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasallik va vaktsinani kiritishning murakkabligi
- yuqumli kasallik yuqori bo'lgan hududga yaqinlashib kelayotgan sayohat
- murakkab epidemik vaziyat
- o'ta xavfli infektsiyaning tarqalish xavfi
- epidemiyadan oldingi davr

#Quyida sanab o'tilgan tibbiyot xodimlaridan qaysi biri bolalar poliklinikalari uchun jamlangan emlash rejasini tuzadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- poliklinikaning bosh shifokori va bosh hamshirasi
- epidemiolog va immunolog
- xudud pediatri va immunologi
- poliklinika immunologi va bosh hamshirasi
- kasalxonada epidemiolog va immunolog

#Bolaga barcha turdagi vaktsinalarni kiritishga qarshi ko'rsatmalarni aniqlashda quyida sanab o'tilgan ko'rsatkichlardan qaysi biri eng mos keladi? (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- muddatli va tug'ilish vazni 2500 g
- vaktsinaning oldingi qo'llanilishiga kuchli reaksiya yoki emlashdan keyingi asorat
- O'RVIning engil shakllaridan keyin haroratni normallashtirish
- o'tkir yuqumli kasalliklar
- klinik jihatdan sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqning immunitet holati ko'rsatkichlarining og'ishi

#Quturishga qarshi vaktsina quturish immunoglobulini bilan birgalikda quyidagi hollarda buyuriladi? (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- quturgan hayvonlarning suti yoki go'shti tasodifan iste'mol qilinganda
- sayohat paytida qushlar tomonidan jarohatlanganda
- noma'lum hayvonlar tomonidan buzilmagan qattiq kiyim orqali tishlashda
- barcha tishlangan odamlar, quturgan kasal hayvonlar
- ro'yxatga olingan hayvonlar tomonidan tishlagan barcha shaxslarga

#Ichak infeksiyalarda vaktsinani kiritish uchun favqulodda ko'rsatkichlarni aniqlang. (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasallikning epidemiyadan keyingi davrida
- yuqumli kasallikning epidemiyadan oldingi davrida

- skarlatina
- gripp
- sil kasalligi
- qoqshol

#Qizamiq va parotitga qarshi tirik vaksinalarni kiritishga qarshi ko'rsatmalar:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- anamnez konvulsiyalar
- malign neoplazmalar
- gemoglobin darajasi 80 g / l dan past bo'lgan anemiya
- OITS
- o'tkir yuqumli kasallik

#difteriyaga qarshi antitelarning himoya titrlari (RPG-ko'rib chiqing (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1:10
- 1:20
- 1:40
- 1:80
- 1:160

#Qanday hollarda ko'k'yo'talga qarshi emlash amalga oshirilmaydi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- anamnezda kasallik, virusli gepatit belgisi, 1,5 yil oldin kechiktirilgan.
- suvchechak bilan og'rigan bemor bilan muloqot
- anamnezda kasallik, virusli gepatit belgisi, 1,5 yil oldin kechiktirilgan.
- 2 oy oldin appenditsit uchun jarrohlik tarixi
- oldingi ko'k'yo'tal kasalligi
- 5 yoshli bola, ilgari parchalanmagan

#Poliomielitning oldini olish uchun kontrendikatsiyalar:(ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'tkir yuqumli kasalliklar
- OITS
- kompensatsiya bosqichida yurak-qon tomir kasalliklari
- harorat 37,5 ° S gacha bo'lgan dispeptik hodisalar
- 37,5 ° S dan yuqori haroratli dispeptik hodisalar

#O'zbekiston epidemik ko'rsatkichlar bo'yicha immunoprofilaktika qarshi ishlatilishi mumkin:(ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriya
- leptospiroz
- shigelloz
- sil kasalligi
- qizamiq

#Qoqsholning shoshilinch profilaktikasi uchun ko'rsatmalar:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- muzlash va II, III va IV darajali kuyishlar
- appenditsit
- kasalxonadan tashqari abortlar va tug'ish
- oshqozon-ichak traktining penetratsion shikastlanishi
- pastki oyoqning yopiq sinishi

#Ot zardobi bilan test ijobiy hisoblanadi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- infiltratning diametri (giperemiya) 0,2 sm dan kam bo'lsa

- infiltratning diametri (giperemiya) 0,2-0,4 sm bo'lsa
- infiltratning diametri (giperemiya) 0,5-0,9 sm bo'lsa
- infiltratning diametri (giperemiya) 1,0 sm va undan ortiq bo'lsa
- PSS kiritilgandan keyin anafilaktik shok bo'lsa

#Qutirishga qarshi muntazam selektiv emlash amalga oshiriladi:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- sportchilar
- sayyohlar
- it tutuvchi
- o'yinchilar
- yovvoyi yirtqich hayvonlar tishlagan odamlar

#Onasi qizamiq bilan kasallangan yangi tug'ilgan chaqaloqda qizamiq immuniteti:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- tabiiy
- sun'iy
- faol
- passiv
- passiv-aktiv

#Ishlab chiqarish texnologiyasiga ko'ra, vaksina preparatlari quyidagilarga bo'linadi:(3ta to'g'ri javobni tanlang)

- korpuskulyar hayot
- genetik
- rekombinant
- bakterial
- virusli

#Immunizatsiyaning immunologik samaradorligi baholanadi:(1 ta to'g'ri javobni tanlang)

- infektsiyaning klinik kechishiga ta'siri bilan
- kasalliklar bilan yuqadigan infeksiyalarning oldini olish bilan bog'liq xarajatlarni tejash uchun
- laboratoriya tadqiqotida fagotsitlar soni bo'yicha
- umumiy kasallanishni kamaytirish
- antikorlarning "himoya" darajasiga ega bo'lgan shaxslar ulushi bo'yicha

#Muntazam selektiv immunizatsiya amalga oshiriladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- bolalar muassasasiga hujjatlar berilgan bolalar;
- tegishli yoshga etgan bolalar
- faoliyatining tabiati tufayli infeksiya xavfi ostida bo'lgan odamlar
- yuqumli kasalliklar o'choqlarida
- Infektsiyaning yuqtirish ehtimoli yuqori bo'lgan odamlar

#Immunoprofilaktikani rejalashtirish uchun bolalar populyatsiyasini hisobga olish:(3 ta to'g'ri javobni tanlang)

- yiliga bir marta bolalarni ro'yxatga olish
- yiliga 2 marta bolalarni ro'yxatga olish
- yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tizimli ro'yxatga olish
- ketgan va kelgan bolalarni tizimli hisobga olish
- yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun emlash pasportini joriy etish

#Quyidagi vaksinalar mushak ichiga kiritiladi:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- BCG

- gripp bilan kasallanishning epidemiyadan oldingi davrida
- gripp bilan kasallangan bemorlar bilan aloqada bo'lgan shaxslar
- grippning boshida davolash uchun
- gripp kasalligining har qanday davrida davolash uchun
- gripp asoratlari davolash uchun

#Kombinatiyalangan emlash kursi (quturishga qarshi immunoglobulin va quturishga qarshi vaksina -ko'rsatilgan):(5ta to'g'ri javobni tanlang)

- hammasini noma'lum hayvonlar tishlagan
- quturgan hayvon tishlagan har qanday odam
- bosh, yuz, bo'yinning har qanday chaqishi yoki jarohatlari uchun
- har qanday lokalizatsiyaning bir nechta chaqishi va keng jarohatlari bilan
- ma'lum hayvonlar tomonidan tishlanishi
- shilliq pardalarga so'lakning tegishi

#Quturish qo'zg'atuvchisining manbai quyidagilar bo'lishi mumkin:(2ta to'g'ri javobni tanlang)

- quturish belgilari bo'lgan it
- it quturishdan 7 kun oldin
- it quturishdan 15 kun oldin
- quturishga qarshi vaksina bilan emlangan shaxs, agar u asoratlangan bo'lsa
- bo'rilar va tulkilar

#Bolalarni BCG vaktsinasi bilan emlash va qayta emlash quyidagi davrlarning qaysi birida amalga oshiriladi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 2 -5 kun ichida, qayta emlash yo'q
- 2,3,4 oylikda, revaktsinatsiya 18 oyda
- 0 -4 kun, revaktsinatsiya 6-7 yoshda
- 2 -5 kun, qayta emlash, 6 -7 va 12 yoshda
- 2,3,4 oylarda, qayta emlash yo'q

#Quyidagi qaysi vaqtlarda bolalar AKDS vaktsinasi bilan emlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- hayotning 5 kuniga qadar
- 2,3, 4 oylarda qayta emlashsiz
- 2,3,4 oylarda 16 oylikda revaktsinatsiya bilan
- hayotning 4 kuniga qadar 6-7 yoshda revaktsinatsiya
- 2,3,4 oylarda revaktsinatsiya 18-oylikda

#Qaysi vaqtda ADS-anatoksini bilan emlash kerak? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 7 va 16 yoshda
- 8, 12, 16 yoshda
- 9 va 15 yoshda
- 9 yoshda
- 6-7 yoshda

#ADS-M vaktsinasi hayotning qaysi davrida o'tkaziladi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 30, 40, 50, 60 yoshda
- 26, 36, 46, 56 yoshda
- 1 yoshda va 6-7 yoshda
- 7 va 116 yoshda
- 1 yil ichida

- zararsizlik
- preparatning chiqarilish shakli
- dori rangi

#Vaksinaning potentsial samaradorligi aniqlangan (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- ko'rinish ko'rsatkichi
- korrelyatsiya koeffitsienti
- xavfsizlik ko'rsatkichi
- o'lim darajasi
- samaradorlik indeksi

#Immunoprofilaktikaning epidemiologik samaradorligi baholanadi (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- kasallanish dinamikasi tendentsiyalari
- mavsumiylik parametrlarining o'zgarishi
- immunizatsiya qilinmaganlarga nisbatan emlanganlar bilan kasallanishning kamayishi
- kasallanishning yosh tarkibining o'zgarishi
- kasallanishning mavsumiyligiga ko'ra

#Vaksina bo'yicha ko'rsatmalar bo'lmasa, bolaga chet eldan keltirilgan vaksina bilan emlash (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- yorliqdagi vaksinaning xususiyatlarini oldindan o'rganib chiqqandan keyin mumkin
- agar vaksina xorijiy vaksina preparatlari ro'yxatida bo'lsa, mumkin
- bu taqiqlangan
- poliklinika bosh vrachi bilan kelishib olish mumkin
- IBMP nazorat qo'mitasi bilan kelishilgan holda mumkin

#Sovuqlik zanjimi samarali ishlashi uchun (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- tibbiy immunobiologik preparatlarni saqlash uchun sovutgich uskunalari
- tibbiy immunobiologik preparatlarni tashish uchun sovutgich uskunalari
- maxsus tayyorlangan xodimlar
- optimal harorat rejimiga rioya qilish monitoringi tizimi
- steril vaksina erituvchilardan foydalanish

#Sovutgich noto'g'ri ishlagan bo'lsa, undagi harorat -6 C ga tushdi, saqlanganidan vaksinadan foydalanishingiz mumkinmi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- difteriyaga qarshi zardob
- ADS-M vaktsinasi
- poliomelitga qarshi vaksina
- gepatit B ga qarshi rekombinant vaktsinasi
- quturishga qarshi immunoglobulin

#Vaksinatsiyadan keyingi reaksiyalar kiradi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- sifatsiz preparatlar bilan emlash tufayli sog'lig'ining doimiy buzilishi
- emlash uchun noto'g'ri tanlash bilan bog'liq jiddiy sog'liq buzilishi
- vaksinani kiritish uchun tananing normal fiziologik reaksiyasi
- immunizatsiya texnikasining buzilishi tufayli tananing patologik reaksiyasi
- aseptika va antiseptikaning buzilishi tufayli tananing patologik reaksiyasi

#Emlashdan keyingi asoratlarga kiradi (3 ta to'g'ri javobni tanlang)

- vaksinani kiritish uchun tananing fiziologik reaksiyasi
- emlash uchun tanlash qoidalarini buzish natijasida yuzaga kelgan tananing patologik reaksiyasi.
- sifatsiz immunobiologik preparatni kiritish tufayli sog'lig'ining doimiy buzilishi

-kasallikdan o'limning mavjudligi

#Qutirishga qarshi vaksina quturish immunoglobulini bilan birgalikda ko'rsatiladi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- quturgan hayvonlarning suti yoki go'shti tasodifan iste'mol qilinganda
- qushlar tomonidan shikastlanganda
- buzilmagan qattiq kiyimni tishlaganda
- hammasini noma'lum hayvonlar tishlagan
- Uy hayvonlari tishlagan har qanday odam

#Vaksinani kiritish uchun ko'rsatmalar (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasallik
- yuqumli kasallikning epidemiyasi avjida
- ma'lum bir yuqumli kasallikning tarqalish xavfi hudud
- yuqumli kasallikning o'tkir shakli bilan og'rigan bemorni davolash
- vaksinani kiritishning murakkabligi

#zardoblar va immunoglobulinlarni kiritish uchun ko'rsatmalarni tanlang (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasallik va vaksinani kiritishning asoratlari
- yuqumli kasallik yuqori bo'lgan hududa kasallanish
- murakkab epidemik vaziyat
- o'ta xavfli infektsiyaning tarqalish xavfi
- epidemiya oldingi davr

#Qizilcha qarshi tirik vaksina bilan bolalarni qaysi yoshda emlash kerak (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1yosh revaksinatsiya 6 yoshda
- 8, 12, 16 yoshda
- 9 va 15 yoshda
- 12-15 oylikda va 6 yoshda revaksinatsiya
- 6-7 yoshda

#Bolalarni tirik parotitga qarshi emlash bilan qaysi yoshda emlash kerak (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 7 va 14 yoshda
- 8, 12, 16 yoshda
- 1 yoshda va revaksinatsiya 6 yoshda
- 12-15 oylikda va 6 yoshda revaksinatsiya
- 6-7 yoshda

#Bolalarga qaysi yoshda poliomielitga qarshi og'iz orqali emlash kerak (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 2,3, 4 oy va 16 oylikda 7 yosh
- 1 yil ichida
- 1 yoshda va revaksinatsiya 6 yoshda
- 1 yoshda va revaksinatsiya 7 yoshda
- 6-7 yoshda

#Uzoq muddatli kuchli immunitetni ta'minlamaydigan vaksina (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- vabo

- tulyaremiya
- chechak
- quturishga qarshi
- qizamiq

#Qoqshol immunoprofilaktikasi necha yoshdan boshlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)
O'zb Res.emlash taqvimini

- birinchi oydan boshlab AKDS ning birinchi dozasi bilan
- AKDS ning birinchi dozasi bilan uchinchi oydan boshlab
- AKDS ning birinchi dozasi bilan ikkinchi oydan boshlab
- AKDS ning to'rtinchi oydan boshlab
- AKDS ning oltinchi oydan boshlab

#Odamlarni brutsellyozga qarshi emlash (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- hal qiluvchi
- ahamiyatsiz
- 2000 yildan beri bekor qilingan
- muayyan epidemiologik vaziyatlarda
- muayyan epizootologik sharoitlarda

#Kuydirgining favqulodda profilaktikasi olib borilmoqda (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik vaktsina
- o'ldirilgan vaktsina
- kimyoviy vaktsina
- immunoglobulin va antibiotiklar
- zardob

#Emlashning epidemiologik samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi: 1ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlanganlar soni, kasal bo'lmagan
- kasallikdan immunoprofilaktika bilan himoyalangan shaxslarning nisbati
- aholini emlashlar bilan qamrab olish darajasi
- emlanganlar orasida kasallanish darajasining kasallanish darajasiga nisbati
- emlanmaganlar orasida
- emlanganlarning kasallanish darajasi

#Emlashning klinik samaradorligi quyidagilar bilan baholanadi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- infektsiyaning klinik kechishiga ta'siri bilan
- kasalliklar bilan yuqadigan infeksiyalarning oldini olish bilan bog'liq xarajatlarni tejash uchun
- kasallikdagi asoratlarni mavjudligida
- umumiy kasallanishni kamaytirish
- antitellarning "himoya" darajasiga ega bo'lgan shaxslar foiziga ko'ra

#Muntazam selektiv immunizatsiya amalga oshiriladi: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- bolalar muassasasiga hujjatlar berilgan bolalar
- tegishli yoshga etgan bolalar
- faoliyatining tabiati tufayli infeksiya xavfi ostida bo'lgan odamlar
- zoonoz yuqumli kasalliklarning tabiiy o'choqlarida
- Infektsiyaning yuqutirish ehtimoli yuqori bo'lgan odamlar

#Rejali emlash quyidagilarga qarshi o'tkaziladi: (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- qizamiq

- yuqumli kasallikning epidemiyasi avjida
- yuqumli kasallikning tarqalish xavfi mavjud bo'lsa
- yuqumli kasallikning epidemiyalararo davrida

Milliy emlash taqvimiga ko'ra, bolalar qaysi yoshda poliomiye litga qarshi tirik vaksina bilan emlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1-5 kun, 2,3, 4 oylik va 16 oylik
- 2, 3 va 4 oylik va 16 oylikda, 7 yoshda
- 2, 3, 4 va 16 oyda, 9 yoshda
- 1-5 kunlik 2,3,4 oylik va 16 oylik 16 yoshda
- 1-4 kun va 6 yoshda (1-sinf)

Milliy emlash taqvimiga ko'ra, bolalar qaysi yoshda jonli parotitga qarshi emlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 1-3 kun, 2 oy, 4 oy ichida
- 2, 3 va 4 oylik va 12-15 oylikda
- 12 oy va 6 yoshda
- 1-5 kun va 2,3,4 va 16oy 16 yoshda
- 12 oyda va 6 yoshda

Milliy emlash taqvimiga ko'ra, bolalar necha yoshda IPV (inaktivlangan poliomiye lit vaksinasi) qarshi og'iz orqali emlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 2, 3 va 4 oy va 16 oylikda
- 4 oy
- 1-3 kun, 2-4 oy ichida
- 1-kun 2-3-4 oy va 16 oy
- 12 oylik va 6 yoshda

Odamlarda sun'iy faol immunitet hosil bo'lishiga ta'sir qiladi (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- organizmning fenotipik va genotipik xususiyatlari
- immunizatsiyaga tayyorgarlik sifati
- emlash taqvimiga rioya qilish
- immunizatsiya texnikasiga rioya qilish
- sovuq zanjirning buzilishi

Jamoa immunitetining darajasi quyidagilarga bog'liq (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- organizm darajasida immunitet ishlab chiqarishni belgilovchi omillar
- immunizatsiya qilinadigan kontingentlarning emlash bilan qamrab olinishining to'liqligi
- epidemik vaziyat
- aholi soni
- aholining demografik o'sishi

Jamoa immuniteti darajasini ob'ektiv baholash (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlash qamrovining to'liqligi
- kasallanishning kamayishi
- serologik tadqiqot natijalari
- allergiya testlari natijalari
- virusologik tadqiqotlar natijalari

Vaksina sifati mezonlari (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- sterillik
- mmunogenlik

#Vaktsinalar qo'llanilishini aniqlang (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- teri usti
- teri osti
- teri ichiga
- mushak ichiga
- vena ichiga yuborish

#Emlashdan keyingi immunitetning intensivligini tekshirish uchun foydalaning (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- RIGA reaksiyasi
- RSK reaksiyasi
- allergiya testlari
- IFA reaksiyasi
- virusologik tadqiqotlar

#Mantu sinamasining ijobiy natijasi ko'rsatadi (3ta to'g'ri javobni tanlang)

- postinfeksion allergiya
- emlashdan keyingi allergiya
- sil kasalligining qo'zg'atuvchisi bilan infeksiyalangan
- sil kasalligiga moyillik
- sil kasalligi bilan kasallangan

#Bemorlar bilan aloqada bo'lgan shaxslarga epidemik belgilarga ko'ra emlash uchun vaktsinalardan foydalanish imkoniyati aniqlandi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- o'ta yuqumli infeksiya
- kasallikning og'ir shakllarini rivojlanish xavfi
- tashqi muhitda patogenning barqarorligi
- inkubatsiya davri tugagunga qadar vaktsinaning immun javobini qo'zg'atish qobiliyati
- infektsiyani davolash uchun

#Bir guruh sayyohlar qorin tif va tulyaremiya bo'yicha noqulay hududga jo'nab ketishga 2 hafta qolganda jo'nab ketishdi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- maksimal mumkin bo'lgan 12-13 kunlik interval bilan emlashni amalga oshiring
- bitta dori ketishdan oldin kiritiladi, ikkinchisi -1-1,5 oydan keyin
- ikkala dorini bir vaqtning o'zida yuborish
- emlash o'tkazilmaydi
- emlashlar ketishdan bir oy oldin amalga oshirilishi kerak

#Qoqsholga qarshi shoshilinch profilaktikasi uchun ko'rsatmalar (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- har qanday hayvonning tishlashi
- terining yaxlitligi buzilgan har qanday shikastlanish
- har qanday kuyish III-IV darajada
- kasalxonadan tashqari abortlar va tug'ish

#Jabrlanuvchi M, 20 yosh, o'ng qo'lining panjalari II darajali kuyishi. Qoqsholga qarshi emlangan, oxirgi marta 16 yoshda emlangan. Hozirda 8 haftalik homilador (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlashni amalga oshirmang, jarohatni jarrohlik davolashni amalga oshiring
- AS-anatoksinni kiritish
- PSS-ni kiritish
- AS-anatoksin -PSS yoki PSCHi kiritish

- zardob
- immunoglobulin

#A grippiga qarshi faol immunizatsiya uchun quyidagi immunobiologik preparatlardan qaysi biri qo'llaniladi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- rimantadin
- inaktivatsiyalangan butun virusli vaktsina
- leykotsitlar interferon
- dibazol
- zardob

#BCG revaktsinatsiyasi uchun bolalarni tanlash uchun maktabda o'quv yilining birinchi oyida 1-sinf o'quvchilariga 2TE bilan Mantu sinamasi beriladi. Bu oyda bolalarga yana qanday emlashlar berilishi mumkin: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- qizamiqqa qarshi
- difteriyaga qarshi
- parotitga qarshi
- tetanozga qarshi
- bu oyda boshqa emlashlar o'tkazilmasligi kerak

#Psevdotuberkulyozning maxsus profilaktikasi uchun quyidagilar qo'llaniladi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- vaktsina
- zardob
- bakteriofaglar
- anatoksin
- ishlab chiqilmagan

#Esherixiozning o'ziga xos profilaktikasi uchun aholiga quyidagi dorilar qo'llaniladi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik vaktsinalar
- o'ldirilgan vaktsinalar
- kimyoviy vaktsinalar
- anatoksinlar
- o'tkazilmaydi

#Bolalar klinikasida emlash rejasini tuzish uchun sizga kerak (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- favqulodda xabar 058
- vaktsinadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- emlash taqvim, bolalar aholisini ro'yxatga olish ma'lumotlari, 063 / U shakli
- butun aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari
- kasallik varaqasi

#Profilaktik emlashni ro'yxatdan o'tkazish uchun hujjatlari (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- yuqumli kasalliklarni qayd qilish jumali
- somatik kasalliklarni qayd qilish jumali
- yuqumli kasallik o'chog'ini epidemiologik tekshirish xaritasi
- parazitlar kasallik o'chog'ini epidemiologik tekshirish xaritasi
- profilaktik emlash kartasi № 063 / y, bolaning rivojlanish tarixi №.
- 064-sonli emlash reestri

#O'zbekiston Respublikasida bolalarni yuqumli kasalliklarga qarshi majburiy emlash belgilandi (ta to'g'ri javobni tanlang)

-JSTT tavsiyalari

-davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlarini ko'rsatish

-hudud hokimining farmoyishi bilan

-tibbiy muassasaning buyrug'i bilan

-aholisining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonun; Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan tasdiqlangan emlash taqvim

#Emlash ishi bo'yicha hisobot berish uchun qanday shakllardan foydalaniladi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

-shakl No 05

-shakl No 06

-358-son shakl

-Shakl No 357/y

-391-son shakl

-№ 25 shakl

#Bolalar qaysi yoshda BCG -emlash bilan emlanadi va qayta emlanadi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-2-5 kun ichida, qayta emlash yo'q

-2,3,4 oylikda, revaktsinatsiya 18 oyda

-1-4 kun ichida, 6 yoshda qayta emlash

-0 -4 kun ichida, 4 oyda qayta emlash

-2,3,4 oylarida revaktsinatsiya qilinmagan, qayta emlanmagan

#Bolalar qaysi yoshda AKDS-4 vaktsinasi bilan emlanadi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-faqat epidemiologik ko'rsatkichlar bo'yicha

-2, 3, 4 oylikda, qayta emlash 18 oyda

-2, 3, 4 oylikda va 18 oylikda revaktsinatsiya

-2-5 kun, revaktsinatsiya 6-7 yoshda

-16 oylarda

#AKDS-4 anatoksin bilan qaysi yoshda emlash kerak (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-7 va 16 yoshda

-8, 12, 16 yoshda

-9 va 15 yoshda

-9 yoshda

-6-7 yoshda

#Hayotning qaysi yillarida ADS-M emlanadi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-2-3-4 oylikda revaktsinatsiya

-26, 36, 46, 56 yoshda

-12-13 yoshda

-16yoshda

-1 yil ichida

#Yuqumli kasalliklarga qarshi shoshilinch emlash uchun ko'rsatma (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-epidemik vaziyat

-kasallanish dinamikasidagi mavsumdan tashqari davr

-jamoaning muhim hajmi

-kemiruvchilar sonining ko'payishi

- individual reaksiya tufayli jiddiy sog'liq buzilishi
- aseptika va antiseptikaning buzilishi tufayli tananing patologik reaksiyasi

#Emlashdan keyingi asoratlarning sabablari bo'lishi mumkin (4ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlash uchun tanlash qoidalarini buzish
- immunizatsiya texnikasini buzish
- sifatsiz dori vositalaridan foydalanish
- emlashga individual javob
- sovuqlik zanjirining barcha qoidalariga rioya qilish

#Bolalarni emlash xonasiga maslahat uchun yuborish kerak (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- emlash jadvalini buzgan holda emlangan
- surunkali kasalliklarga chalinganlar
- emlashdan vaqtinchalik ozod qilish
- emlashdan keyingi asoratlarni rivojlanishi uchun xavf guruhlaridan
- chet eldan kelgan bolalar

#Emlashlarni o'tkazishda xavfsizlikni ta'minlash kerak (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- immunoprofilaktika xavfsizligini nazorat qiluvchi epidemiologlar
- emlashni amalga oshiruvchi tibbiyot xodimlari
- emlash o'tkaziladigan muassasaga tutash hududda yashovchi aholi
- yashash joyidan qat'i nazar, butun aholi
- emlangan

#Profilaktik emlashlarning oqilona kalendarini yaratish ta'minlangan (5ta to'g'ri javobni tanlang)

- birlamchi emlash uchun eng mos yoshni tanlash
- revaktsinaning takroriy soni
- emlashlar orasidagi optimal intervallar
- har xil turdagi vaktsinalar assotsiatsiyasi
- emlash kerak bo'lganlarning 95-97 foizini emlash qobiliyati

#Hozirda infeksiyalarni bartaraf etish dasturlari amalga oshirilmoqda (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- qizamiq
- poliomelit
- virusli gepatit B
- qorin tifi
- shigelloz

#Respublikaning butun hududida rejali tarzda ularga qarshi emlanadi (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- sil kasalligi
- difteriya
- ko'k yo'tal
- kuydirgi
- qizamiq

#ushbu kasallik bilan og'rib o'tgandan song emlanmaydi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

- sil kasalligi
- shigelloz
- gepatit A
- parotit
- gepatit C

-2 oy

#Ko'kyo'talga qarshi emlash quyidagi yoshdagi bolalarda boshlanadi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-tug'ilgandan so'ng 24 soat ichida

-2 oy

-6 oy

-12 oy

-18 oy

#Tuberkulin quyidagilar uchun ishlatiladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-faol immunizatsiya

-passiv immunizatsiya

-immunitetni aniqlash

-tananing allergik qayta tuzilishini aniqlash

-sil bilan kasallangan bemorlarni davolash

#Sun'iy passiv immunitetni yaratish usulini belgilang:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-interferonni kiritish

-immunomodulyatori kiritish

-platsenta qonidan antiyanalar olish

-giperimmun zardob kiritish

-vaksina kiritish

#Qorin tifini maxsus profilaktikasi uchun:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-o'ldirilgan vaksinalar

-zardob

-gammaglobulinlar

-interferon

-anatoksinar

#Qorin tifining favqulodda profilaktikasi uchun:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-immunoglobulin

-antibiotiklar

-zardob

-vaksinalar

-interferon

#Poliomielitning maxsus profilaktikasi uchun qo'llaniladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-tirik vaksina

-anatoksin

-bakteriofag

-immunoglobulin

-o'ldirilgan vaksina

#Vaksinatni boshlashdan oldin quyidagilarni bajarish kerak:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-aholining yosh tarkibi bo'yicha ma'lumotlar to'plash

-kadrlar bilan ta'minlash va tibbiyot xodimlarini tayyorlash

-immunizatsiya qilinadigan shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish

-immunizatsiya xavfsizligi va samaradorligini aniqlash

-amalga oshirilgan emlashlar bo'yicha hisobotlarni tayyorlash

#Bakteriofag quyidagi hollarda qo'llaniladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- faol sun'iy immunitetni yaratish
- passiv sun'iy immunitetni yaratish
- infektsiya o'choqlarida favqulodda profilaktika
- bemorlarni davolash
- yuqumli kasalliklarga chidamliligini oshirish

#Tularin quyidagilar uchun ishlatiladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- immunitetni aniqlash
- tananing allergik qayta tuzilishini aniqlash
- passiv immunizatsiya
- faol immunizatsiya
- davolash

#O'latning maxsus profilaktikasi uchun qo'llaniladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- immunoglobulin
- tirik vaksina
- o'ldirilgan vaksina
- anatoksin
- asotsirlangan vaksina

#Qutuishning maxsus profilaktikasi uchun qo'llaniladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik vaksina
- o'ldirilgan vaksina
- bakteriofag
- kimyoviy vaksina
- zardob

#Poliomielitga qarshi vaksina qo'llash usulini belgilang.(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- intradermal
- og'iz orqali
- teri ostiga
- mushak ichiga
- tomir ichiga

#Qizamiqning maxsus profilaktikasi uchun preparat qo'llaniladi:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- tirik vaksina
- zardob
- o'ldirilgan vaksina
- anatoksin
- kimyoviy vaksina

#Kimyoviy vaksina qo'llaniladigan infektsiyani tanlang:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- poliomielit
- difteriya
- qorin tifi
- qoqshol
- qizamiq

#Bolalar uchun qoqsholga qarshi emlash:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

- 2-5 kunlik hayot
- 2 oy

- 6 oy
- 12 oy
- 18 oy

#Parotitga qarshi emlash usulini tanlang: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- og'iz orqali
- teri ostiga
- tomir ichiga
- mushak ichiga
- tomir ichiga

#Vaktsinalarni saqlash shartlarini tanlang: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- xona haroratida
- termostatda
- muzlatgichda
- tibbiyot shkafida
- emlash xonasidagi stolda

#Geterologik zardoblar qaysi qondan tayyorlanadi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- donorlar
- immunizatsiya qilingan hayvonlar
- giperimmunizatsiyalangan hayvonlar
- kasal odamlar
- tiklangan hayvonlar

#Quyidagi infeksiyalardan qaysi biri majburiy muntazam emlashni talab qiladi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- epidemik paratit
- toshmali tif
- vabo
- brutsellyoz
- shigelloz

#Quyidagi infeksiyalardan qaysi biri muntazam ravishda emlanadi? (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- vabo
- qizamiq
- quturish
- toshmali tif
- vabo

#Immun zardobi quyidagilar uchun qo'llaniladi: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- faol sun'iy immunitetni yaratish
- passiv sun'iy immunitetni yaratish
- passiv tabiiy immunitetni yaratish
- kasallikning diagnostikasi
- faol tabiiy immunitetni yaratish

#Grippning shoshilinch profilaktikasi uchun ishlatiladigan preparatni ko'rsating: (1ta to'g'ri javobni tanlang)

- vaktsina
- interferon
- anatoksin

-CAV-ni kiriting

#Ko'chadagi baxtsiz hodisa qurbonida qoqsholning shoshilinch profilaktikasi, agar oldingi emlashlar qayd etilmagan bo'lsa, amalga oshirilishi kerak (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-faqat KAV

-faqat qoqshol anotoksini

-faqat qoqshol qarshi inson immunoglobulini (PSHI)

-AS-anataksin -PSS (yoki PSCHI)

-faqat ADS-M

#Hayvon tishlangandan so'ng davolashni o'z ichiga oladi (2ta to'g'ri javobni tanlang)

-Sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang

-suv bilan yuvish ixtiyoriy

-yara qirralarini yod bilan ishlov berish

-yaraning yirtilgan qirralarini kesish va yarani tikish

-yaraning chetlarini kesmang va dastlabki 3 kun ichida tikmang

#Qutrishga qarshi emlashning kombinatsiyalangan kursi ko'rsatilgan (2ta to'g'ri javobni tanlang)

-yovvoyi yirtqich hayvonlar tomonidan etkazilgan tishlanishlar

-10 kunlik kuzatuv davomida o'lgan uy hayvonlari tufayli yuz, qo'llar, bosh va bo'yindagi har qanday tishlash yoki timalishlar

-aloqa paytida sog'lom uy hayvonlari tomonidan yuz, qo'llar, bo'yin, boshdagi har qanday tishlash yoki timalgan

-aloqa paytida sog'lom hayvon tomonidan qo'llarning yuzaki bir marta timalishi, elkaning, bilakning, tanasining, pastki oyoq-qo'llarining chuqur jarohatlari, uy hayvonlari tomonidan etkazilgan.

-sog'lom uy hayvonlari bilan aloqa qilish vaqtida shikastlangan terini so'laklashda, tanasi.qo'l va oyoqlar (bosh, yuz, bo'yin, kistalar, barmoqlar va oyoq barmoqlari, perineum, jinsiy a'zolar bundan mustasno) yuzaki tishlash yoki chizish

#Shahar tashqarisida noma'lum it tishlagan fuqaro travmatologiya bo'limiga janob N. yelkasidagi o'rtacha tishlash bilan murojaat qildi.Jabrlanuvchining emlash tarixi noma'lum. Bunday vaziyatda shunday bo'lishi kerak. (3ta to'g'ri javobni tanlang)

-yarani ishlov berish

-quturishga qarshi emlash va immunoglobulinni buyurish

-qoqsholga qarshi emlashni amalga oshiring

-jarrohlik bo'limida kasalxonaga yotqizish

-kortikosteroidlarni buyurish

#Qutirishga qarshi emlanganda, emlanganlar darmonsizlik, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishidan shikoyat qilgan (1ta to'g'ri javobni tanlang)

-belgilangan reja bo'yicha emlashni davom ettirish

-emlashni bekor qilish

-emlashni davom ettirish imkoniyati masalasini hal qilish uchun maslahatlashuv o'tkazish

-emlashni davom ettiring, lekin ularning sonini kamaytiring

-boshqa ishlab chiqaruvchining vaktsinasi bilan almashtiring

#Bolalarni gepatit B ga qarshi muntazam emlash:(1ta to'g'ri javobni tanlang)

-tug'ilgandan so'ng 24 soat ichida

-2-5 kun

-4 oy

-12 oy